



BSS

Échelle d'idéation suicidaire de Beck

Rapport interprétatif

Aaron T. Beck

Nom :	Mademoiselle O
*Âge:	16
Sexe :	Féminin
Situation familiale :	Célibataire
Niveau d'études :	Déscolarisée depuis la 4ème
Administré par :	Examineur exemple
Date de l'évaluation :	02/28/2017

* L'Échelle d'idéation suicidaire de Beck est destiné aux patients adultes de 17 ans ou plus.

Copyright © 2009 NCS Pearson, Inc. Tous droits réservés.

Adaptation française copyright © 2017 by NCS Pearson, Inc. Adaptation et reproduction par Pearson France ECPA avec l'autorisation des éditeurs du test BSS.


BSS et Pearson sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays par Pearson Education, Inc., ou ses filiales.

Ce rapport contient des éléments protégés par la propriété intellectuelle et le droit des marques. L'administrateur du test peut extraire des parties de ce rapport, en se limitant au texte minimal nécessaire pour décrire ses conclusions, afin de les faire figurer dans son compte rendu d'évaluation du candidat, et ce dans le respect de l'obligation de compte rendu liée, le cas échéant, à sa profession. Aucune adaptation, traduction, modification ou version spéciale de ce rapport ne peut être faite sans l'autorisation écrite préalable de Pearson France - ECPA.

[1.1 / 1 / QG]

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION

Le graphique suivant présente la note brute du patient pour l'administration de l'Échelle des idéations suicidaires de Beck.



Note Brute : 20

INTERPRÉTATION

Le professionnel devrait considérer la possibilité que Mademoiselle O présente un **RISQUE DE SUICIDE IMMINENT**. À la BSS le patient a choisi l'affirmation reflétant une intention de suicide effectif :

- Je n'arrive pas à m'empêcher de mettre fin à mes jours.

Cette réponse est plus alarmante étant donné l'histoire rapportée du patient de tentatives multiples de suicide. De plus, le patient signale que son désir de mourir durant la dernière tentative de suicide était fort.

Le professionnel devrait considérer sérieusement le besoin immédiat d'une intervention, peut-être incluant une hospitalisation.

Le professionnel devrait demander au patient quelle méthode il utiliserait pour se suicider. Le niveau global de risque doit être évalué dans le contexte du tableau clinique complet, y compris le niveau de fonctionnement adaptatif du patient, le degré de stress psychosocial, la structure de la personnalité et le syndrome clinique.

Le professionnel doit examiner soigneusement le profil des réponses du patient à la BSS pour obtenir des indications sur les raisons et les facteurs de dissuasion du suicide que le patient perçoit, ainsi que sur l'étendue de la planification qu'il a entreprise. Les items particuliers choisis par le patient doivent être considérés comme des indices qui nécessitent un examen plus approfondi et qui peuvent être utilisés pour structurer un entretien clinique.

ITEMS SÉLECTIONNÉS

[REDACTED]

[REDACTED]

Fin du rapport

NOTE : Toutes les pages de ce rapport contiennent des données confidentielles. Celles-ci ne doivent pas être divulguées sans l'accord du patient. Par ailleurs, conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le patient bénéficie d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression pour motif légitime aux informations qui le concernent, droit qu'il peut exercer en s'adressant directement à l'administrateur du test.
